

INTERNACIA MEDICINA REVUO

Oficiala Organo
de
**TUTMONDA
ESPERANTISTA
KURACISTA ASOCIO**
(T. E. K. A.)



Monata ligilo
de la kuracistoj,
farmaciistoj, dentistoj
kaj aliaj medicin-
rilatantaj profesianoj.

11a Jaro

N-ro 1a

Januaro 1933

ENHAVO

ORIGINALAJ ARTIKOLOJ

P-ro V. JELIN. — Pri loka vakcina kuracado de virina infana gonoreo ...	1
D-ro HAJASIDA-MASAKUJI. — Pseudohermafroditismo	4

POR LA PRAKTIKULOJ

Ce sanga transfuzo kiel eviti la transigon de sifilo	6
--	---

AŬTOREFERATOJ

CUGIO ARAI: Pri rena elsangado pro renvejna cirkula malhelpo ĉe kunikloj. — BRIQUET: Fadenforma duŝo en ginekologio. — KEMPENEERS: Ekstera ostosintezo por femutrompo ĉe infano (kun 1 bildo)	7
---	---

REFERATOJ

RHEINBERGER: Sukcesoj kun « Bromae » kiel nervkvietigilo kaj nutra- ja preparajo. — A. KAPLAN: La problemo de perforacio de peptika ulcero. — HUET kaj BLANCSTEIN: Hepata hipertrofia cirozo kun gra- va ascito. Resaniĝo per diatermio. — SAHARA: Signifo de la endo- krinsistemo en heredfenomenoj. — DAVID: Kiel kuracisto faris griz- kolorajn klientojn. Terapeŭtika argirio. — P. DELMAS-MARSALET: Ostaj malsanoj kaj perturboj de la kalcia metabolismo; pri resaniĝo de du kazoj de malsano de Paget kaj de malsano de Recklinghausen. — DU- COURTIAUX kaj BARBARA: Kontraŭ la planda veruko. — CHAR- PY: Kuracado de ekzemo per loka malvarmigo kaj injektoj de ceziuma eozinato. — LESCAUT: Kazo de denaska senokuleco (anoftalmio) (kun 1 bildo)	9
--	---

DIVERSAĴOJ

Jubileo	8
Elmontrila varbasocio de svisaj apotekistoj (kun 4 bildoj)	14
XXVa Universala Esperanto-Kongreso	16
Dua Internacia Kongreso de la Lumo	17
Internacia Scienca Lingvo. — Novajetoj. — Esperantista Kroniko	19
Bibliografio	20

PANBILINE

HEPATAJ
MALSANOJ



RECTOPANBILINE

MALLAKSO

HÉMOPANBILINE

ANEMIOJ



Specimeno
kaj
Literaturo :

LABORATORIO de la Doktoro **PLANTIER**
ANNONAY (Ardèche) France

INTERNACIA MEDICINA REVUO

DEKUNUA JARKOLEKTO — 1933

ORIGINALAJ ARTIKOLOJ

PRI LOKA VAKCINA KURACADO DE VIRINA KAJ INFANA GONOREO

de P-ro V. JELIN (Odessa).

616 -002 -022.7 (Gonokoko) -085.371

Doktrino pri loka imunigo de histo, profilakse kaj kurace, nuntempe jam havas firman fundamenton el multaj observoj kaj kontrolaj eksperimentoj kaj povas esti konsiderata kiel baza.

En la bazo de tiu doktrino troviĝas interesaj teoriaj opinioj de BEZREDKO pri la esenco de infekto kaj imunŝtato. Se oni ne atentigas toksigenajn malsanojn, ĉiuj infektaj malsanoj dependas de specifa sentemeco al viruso de iu organo (doktrino pri organa aŭtonomio) : haŭto, intestoj, k. t. p. Je restaj eroj de organismo, infektorigino influas, kiel ŝaprofito.

Atinginte imunon de iu organo, pere de ĝia imunigo, ni atingas ankaŭ ĝeneralan imunon. La interna meĥanismo de infektigo kaj imunigo, laŭ BEZREDKO, estas jena : en histoj de animaloj estas specialaj ĉeloj, sentemaj al definitiva viruso : ekz. hisciocitoj de haŭto, ĉeloj de limfaj folikloj, de intestoj, k. t. p. Ili ludas rolon de ensorbanto de viruso kaj nur tiam, kiam « sojlo de sorbeblo » estas trapaŝita, la viruso disvastiĝas en tuta organismo. Male, leŭkocitoj kaptas ĉiun fremdan aĵon, vivan aŭ malvivan, kaj havas tre gravan rolon en la meĥanismo de la imunigo.

Imunon, kiu aperas pro suferita malsano, BEZREDKO interpretas tiel, ke sentemaj histoj estante en konstanta kontakto kun mikroboj kaj kun produktoj de ilia sekreciado, kutimiĝas al ili, la infektado de sentemaj ĉeloj al ili malakriĝas kaj leŭkocitoj, plenumante sian rolon, finfine, ekstermas ilin.

Proksimume sama estas la meĥanismo de la aktiva imunigo : kiam ni enigas parenterale en organismon de animalo la mortigitajn mikrobojn, tiam leŭkocitoj kaptas ilin, dispecigas kaj sekrecias specialan korpon-antiviruson.

Tiu ĉi estas korpo, fortika kontraŭ varmo, kaj eltenas varmigon ĝis 120° C dum 20 minutoj. Sekreciita antiviruso kontaktas kun sentemaj ĉeloj kaj malsentemigas ilin. Por detruo de mikroboj kaj sekreciigo de antiviruso, 15-20 tagoj estas necesaj; sed ĉi tiun procedon oni povas plirapidigi, se oni enigas en la organismon la artefaritan antiviruson, per filtrato de maljunaj kulturoj, kie tiu antiviruso jam estas, estiĝanta en malnovaj kulturoj pro dispecigo de mikrobaj korpoj.

Vakcinoterapio laŭ BEZREDKO celas imunigi nedifektitajn sentemajn ĉelojn. Enigita en organismon de animalo, la antiviruso ensorbiĝas per sentemaj ĉeloj kaj ĝi ludas rolon profilaksian, kiel ĉe aktiva imunigo.

Sed fakto de loka imunigo de histoj kaj organoj, ne bezonas tiom komplikajn hipotezojn kiel estas skribite supre. Uzante kiel ĝeneralan bazon la ĉelan teorion vico da aŭtoroj montris, ke leŭkocitoj partoprenas malgrandan rolon dum detruado de viruso eniĝinta en la organismon; ke ĉeloj de la retikulo-endotelia aparato, al kiu apartenas ankaŭ ĉeloj vagantaj en trankvilo hisciocitoj, kaptas mikrobojn eniĝintajn en la organismon. En unuj okazoj, la ĉeloj de retikulo-endotelia aparato ne kapab'as ilin detrui kaj tiam la mikroboj multobligas en la ĉeloj de retikulo-endotelia sistemo kaj disiĝas de tie en la sangon kaj la sukojn de la organismo.

Artefarita aktiva imunigo, dum imunigo de mortigitaj mikroboj, fariĝas tial, ke la ĉeloj de la retikulo-endotelia sistemo, kaptinte kaj digestinte la mortigitajn aŭ malfortigitajn mikrobojn, ricevas kapablecon digesti ankaŭ la vivajn mikrobojn. Do, dum malsanoj lokitaj en tiu aŭ alia organo, la tasko estas imunigi la lokan hisciocitan aparaton, t. e. doni al la hisciocitoj la kapablecon ne nur kapti, sed ankaŭ detrui kaptitajn mikrobojn. Ĝenerala imunigo de la tuta organismo estas malpli efika, ol loka.

Ni opinias, ke ĉi tiuj konkludoj devas esti aplikataj ankaŭ al gonoreo, kiu estas plejparte la loka infekto de seksaj organoj, kaj ke loka imunigo de la malsanaj organoj devas doni bonajn rezultojn. Sed ni opiniis, ke superflue estas apliki gonokokan antiviruson por imunigo, konsiderante la hipotezon de BEZREDKO pri antiviruso kiel ne tre bazitan. Ni decidis, por loka imunigo de la seksaj organoj de virinoj, apliki vakcinon, ĉar bakteriajn korpojn ni opinias esti la ĉefa kaŭzo de artefarita immuno. Se filtrato de staf'lokokaj kaj streptokokaj ku'turoj donas bonajn rezultojn dum malsanoj kaŭzitaj de staf'lokokoj kaj streptokokoj, do, laŭ nia opinio, ĉi tio ne estas pro antivirusa influo, sed ĉar en filtrato de maljunaj kulturoj estas, en solvita stato, albumeno de detruitaj mikroboj. Do loka imunigo de histoj per filtrato de kulturoj estas surogato de loka imunigo per vakcino kaj povas esti aplikata tie, kie absorbebleco de vakcino estas malbona, ekz. dum imunigo de la haŭto; tie, kie absorbebleco de vakcino estas bona, ekz. dum imunigo de mukozoj, estas pli bone apliki vakcinon.

Dum loka profilaktika imunigo, imunigas la tuta hisciocita aparato de sana organo; dum imunigo de malsana organo oni influas per loka imunigo, por intensigi la funkciadon de nedifektitaj histiocitoj.

Vakcinon aplikitan dum loka imunigo ni preparis jene: « matrac » boteleton ni ŝarĝis per gonokoka kulturo (ĉi tiu « ŝtamo » (kulturo) estas apartigita jam delonge kaj kutimiĝis vivi sur artefarita medio; ĝi konserviĝis en anaerobaj situacioj). Sur ascit-agaro, kulturo de gonokoko kreskis ĉe 37° en termostato, poste oni forlavis ĝin per fiziologia solvaĵo tiel ke 1 cm³ estus sur 1 cm² da ascitagara surfaco. Poste oni varmieis la gonokokan emulsion en akvobano ĉe 50° C dum 1/2 horo kaj, por konserviĝo estas aldonita 3/4% da kloroformo. Unu cm³ da emulsiĝo havis 10-12 miliardojn da gonokokaj korpecoj.

Oni aplikis kutime tamponadon de la utero kaj de la vagino. Ginekologoj opinias uterkolon *noli me tangere*, tamen, niaj observoj montras, ke uterkolon oni povas sendangere tamponigi, aplikante tute sterilan materialon kaj agante per sterilaj manoj kaj iloj.

Tamponado de la uterkolo kaŭzas absorbon de vakcinaj gonokokoj en la histon de l'utero kaj de la parametro, dank'al abunda reto de limfaj vazoj, tio produktas imunigon de la profundaj histoj, tiom malfacile atingeblaj per diversaj desinfektiloj. Dozo por plenaĝa virino, tamponon trasorbas per 5 cm³ da vakcino, por infanoj, 3 cm³ da vakcino.

Tekniko :

Antaŭe oni enŝprucigas la vaginon per bolita akvo, sen iu desinfekta aĵo. Tra sterila speculo de Cusco oni viŝas la vaginparton de la utero kaj la vaginon seke per sterilaj vataj pecetoj. Poste, per longa pinĉilo de PLEJFER kaj peceto da sterila gaza bandaĝo transorbita per vakcino, oni tamponas la vaginon (bandaĝo longa je 36 cm., larĝa je 6 cm.). Tampono restas dum unu tago, poste oni eligas ĝin kaj tamponas denove. Post dufoja tamponado, oni interrompas unu tagon. Sume oni enigas de 15 ĝis 20 tamponoj, laŭ la graveco de la malsano. Dum unuaj subakutaj okazoj, kie simptomoj de gonoreo jam estis nevideblaj, randon de tampono, ensorbitan per vakcino oni almetas al ekstera truo de uretro. Tamen poste ni ŝanĝis la teknikon : en la uretron je 1 1/2 cm. ni enigis mallarĝajn, mallongajn gazrubandojn, transorbitajn per vakcino, en kelkaj tre penigaj okazoj, ni verŝadis antaŭe en la uretron 1-1/2 cm³ da vakcino, kaj poste tamponis. Antaŭ tamponigo la malsanulino devas urini kaj oni konsilas al ŝi ne multe trinki, por pli longe enteni tamponon. La malsanulinoj devas enteni tamponon en uretro dum 5-8 horoj. Kiam la pacientoj deziras urini, ili mem eltiras la tamponon.

Ni observadis 20 kazojn de virina gonoreo, kuracitajn per loka vakcinigo : en unu akuta kazo, la rezulto estis bona, en 10 subakutaj, rezultoj estis 4 malbonaj, 6 bonaj, en 9 kronikaj rezultoj estis 3 malbonaj, 6 bonaj. Ni rimarkis bonan influon de loka vakcinigo sur gonoreajn eroziojn sur uterkolo.

Do, niaj *konkludoj* estas jenaj :

1. Loka vakcinado dum virina gonoreo, sendube, bone influas.
2. La nombro de tamponoj, necesaj por vakcinigo, estas nedefinita kaj bezonas pliajn observadojn.
3. Loka vakcinigo influas fortire kaj dissorbe sur la organojn de pelvo.
4. Loka vakcinado, plejofte, dum 15-20 tagoj, forigas la gonokokojn.
5. Observa 3-5 monata templimo ne estas sufiĉa por fina opinio; oni bezonas longan observadon ĉe granda materialo.

Knabina Gonoreo : Tekniko.

Antaŭe oni ŝprucigas per sterila akvo, oni enigis en la vaginon gazo-tamponon 8-10 cm. longan kaj 1-2 cm. larĝan, trasorbitan per vakcino, per Plejfera sondilo. La tampono restas en la vagino dum unu tago. Post 2-3 tagoj, unutaga paŭzo. La vakcino ne donas ĝeneralan reakcion.

En 3 kazoj, la tekniko estis ŝanĝita : oni antaŭe enŝprucigis, (post akva ŝprucado), en la vaginon 1-2 cm. da vakcino, poste oni enigis tamponon, trasorbitan per vakcino.

Rilate la kazojn de knabina gonoreo de ni observitajn, ni povas diri jenon : el 3 kazoj de kronika gonoreo, 2 estas malbonrezultaj kaj 1 bonrezulta. Ni observadis ilin dum 1 1/2 ĝis 2 monatoj. Por definitiva opinio estas necesa pli longa tempo. El 5 kazoj de akuta kaj subakuta knabina gonoreo, ni konsideras ĉiujn bonrezultaj. En ĉiuj okazoj ni rimarkis malgrandiĝon de sekretaĵo post la 6-7a tampono, kaj malaperon post 10-12a tampono.

Gonokokoj, rimarkeblaj, en ĉiuj okazoj, antaŭ kuracado, post kuracado malaperadis. Tie ĉi ni prenis arbitran nombron de tamponoj ; eble, estontaj esploroj montros, ke oni devas pligrandigi la nombron de tamponoj. Se oni atentis, ke nura kuracado per desinfektaj rimedoj, plejparte, donas neniajn rezultojn ĉe infangonoreo, tiam ĉe provizora malapero de sekretaĵo kaj gonokokoj ĉe infanoj, jam pravas, ke ebla estas loka imunigo dum gonoreo. Kiom ĝi estas firma kaj per kioma kvanto da tamponoj ĝi povas esti atingebla, tio estas demando de pliaj esploroj kaj eksperimento ĉe grandnombra materialo.

(El *Vestnik Sovremennoj Medicini*) Trad. N. HOLM.

El la patologia instituto de Kjuuŝuu Imperia Universitato, Fukuoka

PSEŬDOHERMAFRODITISMO

de D-ro HAJASIDA-MASAJUKI.

Temas pri 35jara homo, kiun oni konsideras viro. Li suferis je *dementia praecox* kaj estis kuracata en la psikiatria kliniko de nia universitato. Dum la kuracado li mortis de *kakke'o*. Oni sekciis lin la 12an de Februaro 1930.

Lia *vivhistorio* : liaj hepatroj rimarkis hipospadion jam dum lia infaneco. De la aĝo de 16 aŭ 17 jaroj, li fariĝis evidente ornamema. Erektaj estis rimarkataj de la 4a aŭ 5a jaro ĉe urindeziro. Dum ĉirkaŭ 3 jaroj de post la 24a jaro, li vivis kun virino. Dumtempa seksvivo estas neklara. Pri hermafroditismo neniu, eĉ li mem ne rimarkis. La voĉo estis vireca ; je la 15a aŭ 16a jaro voĉoŝanĝo okazis.

Jen ĉefa parto de *sekcio-protokolo* : iom nebene nutrita kadavro, staturo iomete malgranda, ostokonstruo delikata. Sultroformo estas

CALCIUM-SANDOZ

La granda antaŭenpaŝo de la **Kalciterapio**,

STOMAKA

bone tolerata kaj asimilata

per vojoj :

VEJNA

rapida agado

MUSKOLA

je efikaj dozoj

FABRIKO DE HEMIAJ PRODUKTOJ antaŭe SANDOZ
BALE-BASEL (Svisujo).



Efikaj klinike elprovitaj specialaj preparadoj de D-ro Richard Weiss

Enkondukitaj en pli ol 50 landoj de la mondo

Virilinets
mask.

Fertilinets
fem.

aktivigitaj, standardizitaj hormon-preparadoj por efika kontraŭbatalado de trofruj aperaĵoj de maljuniĝo neŭrastenio k.t.p.

Santuben

laŭ prof. Wolff-Eisner por la trahaŭta kuracado de tuberkulozo.

20-jara praktiko en preskaŭ 20000 kazoj. Rekomendita i. a. de d-ro Besredka, Parizo, ĉefkuracisto d-ro Eckstein, d-ro Gunter, Londono.

**Leanogin-
Dragées**

Aktivigita hormon-preparaĵo, ligita kun vegetaj ekstraktoj por kontraŭbatalo de endokrina adipozo.

En la *L-dragées* laŭ d-ro Weiss unuafoje estas prezentita hormonpreparaĵo sur scienca bazo, efike foriganta la kaŭzojn de la adipozo.

Pancresalets

Pankreas - Hormon-Tablojdoj kontraŭ diabeto sukera. Unika aktivigita rimedo perbuŝe aplikebla por rapida redukto de la sukera eligo.

Sciencaj literaturaĵoj kaj porkuracistaj specimenoj je dispono

D-ro Richard WEISS, fabrik. de farm. prepar., BERLIN, NW 6, Luisenstrasse 51

Kripke

ESTON- VASELINE

la senmikrobiga vazelino

KONTRAŬ KRURDOLOROJ,

ĉe vund- kaj sap- sentema
HAŬTO, en ginekologia prak-
tiko de 30 jaroj elprovita

ESTON- OVALE

(Eston kaj kakaobutero)

KONTRAŬ BLANKA FLUO

la puriga rapida rimedo kon-
traŭ senkomplika leŭkoreo

Hemia fabriko

Kripke, Dr. Speier & Co.,
Berlin SO 36 (Germanujo)

Universala Esperanto-Asocio celas:

Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.

Plifaciligi la ĉiuspecajn moraliajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco, religio aŭ lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoj, kies intelekta aŭ materiaj interesoj celas trans la limojn de ilia genta aŭ lingva teritorio.

Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco kaj disvolvigigi ĉe ili la komprenon por fremdaj popoloj.

La Asocio estas neŭtrala rilate al religio, nacieco aŭ politiko.

donas:

Al la membroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpaĝan Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperantistaj grupoj, gazetoj, organizaĵoj, kum sciigoj pri internaciaj rilatoj ktp.

Al la Membro-Abonantoj: Krom tio la gazeton „*Esperanto*“, internacia ĉeforgano de la Esperantistoj, kun artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj informoj pri la movado.

Al la Subtenantoj: Krom ĉiuj dokumentoj, kiujn ricevas Membro-Abonanto, premion konsistantan el la Esperanto-literaturo.

*Ĉiu aliginto rajtas presigi senpage korespondan anoncon unufoje en la gazeto „*Esperanto*“.*

kaj postulas nur modestan kotizon de 5 Fr. por Membro, de 12,50 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro-Subtenanto.

Universala Esperanto-Asocio
Tour de l'Île, Genève (Svislando)

Arteriosklerozo,

Reŭmatismo,

Podagro,

Vezikacida diatezo,

Neŭrastenio

Radiosclerin



Hejma

Radium - Trinkkuracado

1-2 premaĵoj, solvitaj en vinglaso
da akvo, havigas ĉiam freŝan
mineralakvon.

Sen alia recepto : uzota trifoje
ĉiutage laŭ tiu maniero.

*Detala literaturo kaj specimenoj
por kuracistoj haveblaj de*

RADIOSCLERIN, G.m.b.H.

Berlin S. W. 68.,

Alexandrinenstr. 26, Germanujo

virintipa. La dekstra mano similas al tiu de 14 aŭ 15jara knabino, tamen la maldekstra estas plata kaj virtipa. Internaj organoj havas nenian skribindan nenormalaĵon. Seksorganoj : pubharoj kreskas virintipe, ilia supra limo estas horizontala. Peniso estas forte pigmentita, iom malgranda; ĉe glano troviĝas unu malgranda malprofunda kavaĵo, sed ĝi finiĝas blinde kaj tien uretro ne kondukiga. La skroto ankaŭ estas altgrade pigmentita, malgranda kaj sen multaj sulkoj; ĝia supra parto komenciĝas de ambaŭ flankoj de penisradiko, la malsupra parto malgrandiĝas kaj finiĝas je la mezo de perineo.

La tuta figuro iomete similas al granda vulva lipo de virino. En skroto neniu malmolaĵo estas palpebla. Inter ambaŭ skrotoj troviĝas du valvoformaj laŭlonge kurantaj etaj sulkoj kiuj iomete similas al malgrandaj vulvaj lipoj. Inter ili rimarkiĝas la uretra meato.

Sondilo tra la trueton atingas urinvezikon je ĉirkaŭ 6 cm. Post urinveziko estas plata, malregulforma utero iomete maldekstren dekliniĝinta, tre malbone kreskinta. De la fundo de utero kuras ambaŭflanken respektive unu salpingo. Je la dekstra propra ligamento de ovario pendas ambaŭflanke du ovariosimilaj aĵoj. Tranĉfaco de la antaŭflanka ovariosimilaĵo estas preskaŭ ovarieca, sed neniu flava korpo k. c. estas rimarkebla; tiu de la postflanka estas ruĝbruna kaj kompakta. Vagino komenciĝas de la vagina parto de la utero kaj antaŭmalsupren direktiĝas ĝis uretro; ĝi permesas apenaŭ trapason de unu fingro.

De ĉi supraj makroskopaj observaĵoj, oni vidas, ke la paciento (aŭ pacientino) posedas « virinan seksglandon t. e. ovarion » kaj ceterajn virinajn internajn seksorganojn, dum la eksteraj seksorganoj similas al tiuj de viro, ĉar li (aŭ ŝi) havas penison k. c. Do ni diagnozis nian kazon « virina ekstera pseŭdohermafroditismo ».

Sed, je nia granda intereso, nia mikroskopa esploro tute renversigis nian makroskopan antaŭsupozon. En la postflanka el ambaŭ ovariosimilaj aĵoj, ni mikroskope konstatis restaĵon de testikohisto kaj en la antaŭflanka tiun de epididimokanalo. Nome la ovariosimilaj aĵoj ne estas vera ovario, sed tute kontraŭe testiko.

Tiu ĉi individuo posedas ja testikon, sekve ne estas virino, sed devas esti viro.

Nun ni atingas jenan konkludon : ĉe tiu ĉi individuo, ĝermoepitelio kreskis virece kaj konstruis viran seksglandon t. e. testikon, kvankam ĝi estis rudimenta kaj restis en abdomeno, sed MULLER'a kanalo ne malaperis kiel en normala stato, kontraŭe ĝi forte kreskis kaj konstruis salpingon, uteron kaj vaginon, t. e. virinajn internajn seksorganojn. Do la tuta stato estas « vira interna pseŭdohermafroditismo », tio signifas : viro, kies internaj seksorganoj ŝajnas aŭ estas virinecaj.

POR LA PRAKTIKULOJ

ĈE SANGA TRANSFUZO KIEL EVITI LA TRANSICON DE SIFILO.

615.38 -035.4

La sangaj transfuzoj estas pli kaj pli uzataj, sed, en kelkaj kazoj, la sangdoninto transigis sian sifilon al la ricevinto. Kiel tion eviti? La gazeto *La Clinique* liveris en sia oktobra numero la elementojn de enketo kiun kelkaj kvalifikataj kuracistoj faris por ĝi pri tiu temo.

La necesaj antaŭzorgoj povas esti : unue la moralaj garantioj de la sangdononto, due zorga ekzameno de tiu ĉi (haŭterupcioj, k.t.p.), trie la sterilizado de la injektota sango.

Moralaj garantioj. — Ne estas facile altrudi la ĉastecon al la sangdonontoj sed ĉiuokaze ili devas certigi ke ili ne sekskuniĝis depost 25 tagoj, ĉar la treponemoj multiĝas en la sango antaŭ la apero de ŝankro, do individuo, ekstere ŝajnanta nesifilulo, povas esti tia kelkajn tagojn post suspektinda koito, kaj per sia sango doni sifilon. Ofte, sed ne ĉiam, la edzo estas taŭga sangdononto por sia edzino. Generale la kuracistoj, la medicinstudentoj estas rekomendindaj sangdonontoj ĉar ili komprenas, kiel teruran prirespondecon ili akirus se ili transdonus sifilon; ili sin detenas de oferdono de sango se ili sin scias suspektindaj, ekz. se ili sekskuniĝis depost malpli ol 25 tagoj.

Korpa ekzameno de la sangdononto. — Zorge oni serĉu erupciojn ĉe haŭto, ĉe mukmembranoj (amigdalaj, utera kolo, k.t.p.); oni faru serologian ekzamenon, ĉefe W.-reagon. Tiu ĉi estu ĉiam farata escepte se tute urĝas la transfuzo. Pri la profesiaj sangdonantoj, D-roj AUBERTIN, PAUCHET, BECART opinias necese, ke ili posedu poŝkajeron sur kiu estis notitaj la rezultoj de W.-R. faritaj je regulaj intertempoj.

Sterilizado de la transfuzota sango. — Sensukcese oni provis aldoni al ĝi hidrargan cianidon. Escepte la arsenoksido kiu estas tro toksa por uzado neniu antisifilrimedo detruas *in vitro* la treponemon. Eble la sulfarsenolo taŭgus, ĉar ĝi antikoagulemigas la sangon je la dozo de 6 cgr. %, do konvenus por provoj. Fakte oni devas ofte sterilizi 700 aŭ 800 kcm. da sango, do estus necesaj grandaj dozoj da ĥemia produktaĵo neniam tute sendanĝera. La tindalizado tro modifas la sangon. V. PAUCHET, BECART, FRUHINS-HOLZ akceptas neniam sterilizadon kaj konsilas uzadi nur puran sangon (eĉ sen aldono de citrato). La plej multaj opinias neebla la sterilizadon de la sango.

La sango de individuoj antaŭe sifiluloj sed zorge kaj longtempe kuracitaj, je W.-R. negativa, uzata en kelkaj kazoj pro manko de alia sango, ne transdonis la sifilon.

BRIQUET (Lille).

De Trouette-Perret

APHLOÏNE

Specifa rimedo kontraŭ la
malordoj de la Menopauzo
kaj de la vejna aparato.

LA NISAMÉLINE

(GUAKO)
Jukoj-Ekzemoj-Prurigoj
Neŭralgioj

LA PAPAÏNE

Gastro-Enteritoj-Laksoj
Vomoj
Dispepsiaj malordoj

PARIS — 15, Rue des Immeubles-Industriels — PARIS

Dumex-Salbe

En tuboj

1. LA CEFA

Kontraŭhemoroida rimedo

KUN PLENA EFIKO

origina tubo kun kanulo po 35 gr. kaj anstataŭanta tubo

En skatoloj

Speciala ungoento kontraŭ

2. Krurdoloroj

kaj por ĝenerala vundterapio
po 20, 60 kaj 150. Klinikpakajo po 400 gr.

En ovula formo

PLEJ AGEMA

3. FLUORPREPARAJO

por utero-vagina kuracado

6 pecoj kaj 1 dekduo. Klinikpakajo 3 dekduoj.

Laboratorium Miros, Dr. K.&H. Seyler, Berlin NO 18

Science rekonata

eminenta preparaĵo!

konstatita per komparo kun konataj kontraŭ-hemoroidaj rimedoj farita de D-ro Thom, fako de interna medicino de la

Chirurg. Univers. Polikl., Berlin

kontraŭas inflamon, forigas jukeksiton, malhelpas doloron, haltigas sangadon

Glitrimedo

vekanta fekadon.



Krurulcero, dekubita eskaro, intertrigo, brulvundo, dermito, urtikario, ĉiuspeca prurito, malseka ekzemo.

Flebito kaj trombozo

Liter.: O. Köster, la univers. akuŝliniko, München, « Münch. med. Woch. », 1931, n-ro 40.

Forigas radikale inflamajn statojn de mukozo, jukadon kaj brulojn, kontraŭ erozioj, ŝvelaĵoj, vaginito, kataro, hemoroidoj, prostatito.

Post akuŝo, operacio, kaŭterizo, surradiado.

Liter.: H. Fink, univers. virin-kliniko, Leipzig. P-ro D-ro Sellheim « Der prakt. Arzt. », 1929.

Literaturo kaj specimenoj laŭdezire
Ŝpariga Uzebla por malsanulkaŝoj

Laboratorioj BRUNEAU kaj K^{io}

(MARKO TRIOLLET)

PARIS — 17, Rue de Berri, 17 — PARIS

LIGILOJ STERILAJ AŬ NE

Katgutoj — Firenzaj Haregoj — Silkfadenoj — Linfadenoj — Bronzfadenoj

KAŬČUKAJ ARTIKOLOJ KAJ CANTOJ

“Cutiplaste” BRUNEAU

SPARADRAPO KUN ZINKOKSIDO PERFEKTE ALCLUIĜANTA

Agento por Belgujo : Marcel DU BLED, 192, rue des Palais, Bruselo

Terpíchin

Urologie
Gonorrhæe
Epididymitis
Prostatitis

Dermatologie
Furunkulosis
Trichophyllia
Ekzema

Gynaekologie
Adnexerkrankungen
Parametritis
Oophoritis

Chirurgie
Septische Prozesse
Arthritis
Phlegmone

Ophthalmologie
Hordeola
Conjunctivitis
Ekzema

Innere Medizin
Nephritis
Bronchopneumonie
Phlebitis

Ni petas vin postuli
de ni senpagan
specimenon
kaj literaturon.

Chemisches Institut Dr. Ludwig Oestreicher G.m.b.H.
Berlin – Schöneberg

Varikoj, Flebitoj
Hemoroidoj
Cirkuladaj malordoj
Hipertensio
Kongestaj statoj de la menopaŭzo.

HAMAMELIODE

(Malŝanĝema Kombinaĵo de Jodo Kaj Hamamelo)

X gutoj da Hamameliode entenas ekzakte 0,01 da Jodo tute kombinita kun 0.25 da ekstrakto je egala pezo da vegetaĵo.

DOZOJ : 30 ĝis 50 gutojn potage, en du aŭ tri fojoj.

Laboratorio OBERLIN, 17, rue Cadet, Parizo

J. TINARDON, unuaklasa apotekisto el Altlernejo de Parizo,

AŬTOREFERATOJ

CUGIO ARAI. — Pri rena elsangado pro renvejna cirkula malhelpo ĉe kunikloj. (El la *Patologia-Bakteriologia Instituto de Keio-Universitato de Tokio*, direktoro : P-ro D-ro KUSAMA.)

612.446.69

Studinte la genezon de la t. n. « idiopatia rena elsangado », mi divenis ke la elsangado okazas geneze de loka sangostagno. Starigante tiun vidopunkton mi faris eksperimentan histologian studon pri stagneca elsangado kiu estis okazigita de renvejna ligo ĉe kunikloj, kaj akiris la jenajn rezultojn.

1. Kompleta malhelpo de la renvejna cirkulado kaŭzas ĉe la reno facile kaj rapide stagnecan kapilaran elsangadon. Parto, ĉe kiu aperas plej evidente la stagno kaj elsangado en la frua periodo, estas la kapilaroj kiuj troviĝas sub renpapila epitelo, sub epitelo de papila kuniĝa kanalo, sub la epitelio de renkaliko kaj renpelvo, en la rensinusa grashisto, en la ĉirkaŭvejna kuniga histo k. t. p. Edemo kaj nekrozo de la histo pro stagno, disrompiĝo de la histo pro elsangado ekmontriĝas en la substanco medola precipe ĉe papilo, iom post iom ili atingas al la substanco kortikala kaj fine la tuta reno nekroziĝas. Elsangado antaŭiras ĝenerale histedemon, kaj ĝi ĉesas kun halto de la sangocirkulado.

2. Ĉe malkompleta malhelpo de la renvejna cirkulado, la elsangado kaj la nekrozo estas limigitaj unuloke, ĉiukaze tio troviĝas ĉe renpapilo; en la vejno formiĝas tavolo ĝinta aŭ histiĝinta trombuso. Estas evidentaj kalkiĝo (kalcifikacio) de la urinkanaleta epitelio kaj kapilaro, kreskado de la interstica kuniga histo, dikiĝo de la BOWMANA kapsulo, de la renkapsulo k. t. p. Stagno estas altgrada ĉe la limo inter nekroziĝinta parto kaj la normala; ĉe la renkapsulo precipe renporda parto ekaperas akcesora cirkulado.

3. Ĉe unubranĉa cirkula malhelpo de la renvejno, stagno kaj elsangado okazas, limigitaj nur ĉe la regiono zorgita de tiu branĉo. Historompiĝo kaj nekrozo ne estas altgrandaj.

Konklude, reno estas organo en kiu facile kaj rapide okazas stagnado kaj elsangado pro malhelpo de vejna cirkulado; la ĉefa elsangado estas subepitelia kapilara, frontanta kontraŭ papila kuniĝa kanalo, renkaliko kaj renpelvo, eritrocitoj facile enfluas en la kanalon kaj kavon (Lumen); tiaj trovaĵoj koincidas kun histologiaj trovaĵoj ĉe la idiopatia rena elsangado.

(Esperantigis JUNKO).

BRIQUET (Lille). — Fadenforma duŝo en ginekologio. (El *Phare Médical*, novembro 1931.)

618.14 -002 -085.838.91


La aŭtoro vidis la funkciadon de la aparato de ALECHINSKY por fadenforma duŝo (vidu la artikolon de I. M. R. pri tiu temo). Li opinias ke verŝajne estus tre utile uzadi tiun aparaton en ginekologio

kontraŭ la kronikaj metritoj, kaj ĉefe por modifi la utercervikojn dikajn kaj ulceratajn, malfacile resaniĝantaj per la kutima kuracado (tamponoj, vaginovuloj, vaginduŝoj). La uzo de Pireksvitreca speculo laŭ Fergusson modelo faciligus la teknikon.

KEMPENEERS (Bruxelles). — **Ekstera ostosintezo por femur-rompo ĉe infano.** (*El Bull. et Mem. de la Soc. Belge d'Orthopédie*, IV, n-ro 4, p. 88.)

616.718 .001.5 -089.8

En la ĥirurgia fako de D-ro Parisel (Hôpital Saint-Jean, Bruxelles) la aŭtoro observis 8-jaran knabeton, kiu, pro aŭtomobil-akcidento, suferis rompon de la du femurostoj. Post nesukcesa ortopedia kuracado, D-roj Parisel kaj Kempeneers operaciis, kaj fiksitis ambaŭ femurostojn per eksteraj fiksiloj, laŭ modelo de Conn.



La redukto estis tute perfekta, kiel montras la ĉi kunaj radiografiaĵoj, rilatantaj la maldekstran femuroston (tiu de la dekstra femurosto estas tute kompareblaj). La infano tute kaj rapide resaniĝis.

.....

JUBILEOJ


Korajn gratulojn al niaj fervoraj pioniroj kaj senlacaj amikoj :
P-ro O. BUJWID, kiu festis sian 75an naskiĝdaton, kaj D-ro F. BLUTH, kiu festis sian 70an naskiĝdaton.

.....

Julien BITTNER

Fabrikanto de ĥirurgiaj instrumentoj

1, rue des Fabriques, Bruxelles (Belgujo).



Ekstera fiksilo de D-ro CONN (1/3).

POR KONTRAŬDOLORA BATALO

Terucyl

kontraŭ

Reŭmatiko - Membrodoloroj

Iŝiatika neŭralgio

Avantaĝoj : Rapida penetrado en la haŭto sen alia dolorincito per masaĝo.

Fidinda kaj daŭra ĝisfunda efiko.

Komerc.-formo : En tuboj.

Prezo : RM. — 70.



Citrovanille Otto

kontraŭ

Neŭralgioj - Migreno
Nervodoloroj

Avantaĝoj : Fidinda, rapida agado sen kor- aŭ stomak-maloportunajoj. Granda terapeŭtika kampo, neniuj amasiĝdangeroj. Ankaŭ kontraŭ post-operaciaj doloroj.

Komerc.-formoj : en oblatoj kaj en pulvoroj.

Prezoj : 12 oblatoj, RM. 1.05.
6 pulvoroj, RM. 1.05.

Literaturo ricevebla pere de administracio de la gazeto aŭ de la sola preparanto OTTO & K^{io}, Frankfurt a. M. S. 10 (Germanujo).

PHOSOFORME

ĈEFAJ INDIKOJ

Ciuj nutradaj malordoj — Resaniĝo — Laceco
— Dispepsio — Neŭrastenio — Litiazo —
Fosfaturio — Haŭtmalsanoj — Kolibaciloj
— Tuberkuulo — Malgrasiĝo — Azotemio
— Oksalurio — Sklerozo — Kronika reŭma-
tismo. — Ĉiuj alkalozaj statoj.

BIBLIOGRAFIO

CAVALIE, fakultata profesoro, Bordeaux
ESCAI, fakultata profesoro, Toulouse
GERARD, fakultata profesoro, Lille
LAIGNEL-LAVASTINE, fakultata profesoro, Paris
REMOND, fakultata profesoro, Toulouse
SPILLMANN, fakultata profesoro, Nancy

po 2 supkuloj ĉiutage; ĉiu kulero en granda glaso da trinkaĵo
(blanka aŭ ruĝa vino kun akvo kaj sukero), trinkota dum la
tagmezaj kaj vesperaj manĝoj.



Antineuralgicum
Antirheumaticum
Antipyreticum
Antidolorosum

La malmultekosta fidele efika

Phenalgétin

Acetyliol. Phenacelin 22 0,25 Cod. ph. 001 Noc. Col. 002

DR. HUGO NADELMANN • STETTIN

REFERATOJ

RHEINBERGER (Karlsruhe). — **Sukcesoj kun « Bromæx » kiel nervkvietigilo kaj nutraĵa preparajo.** (El *Münch. Med. Wochensch.*, 1930, n-ro 6.)

61.782.21

Grava faktoro en la taksado de la valoro de moderna preparajo estas la utiligeblo per la digestorganoj kaj ĝia bonfartigeblo. La gusto devas esti tia, ke en longedaŭra aplikado ĝi ne kaŭzas naŭzon, fine rimedo devas esti malkara.

Bromæx en pakajeto de 12 gramoj entenas 40 dozojn, po 1 gramo da natr. brom. Ĉi tiu novspece alligita al feĉekstrakto efikas tia ke la fluidaĵo povas esti prezentata kiel buljonforma trinkaĵo. La feĉekstrakto plue celas : prizorgi per sia stimulantaj efiko plibonan sekrecion de la stomaka suko kaj de ampleksa rezorpcio, ne nur de la materialo de la feĉekstrakto mem, sed ankaŭ de la ceteraj manĝaĵoj. Tiel la ŝtofinterŝanĝo plialtiĝas kaj la ĝenerala bonfarto favore estas influata. La sekvo estas malplidaŭro de la malsantempo. Per detalaj laboroj de spertuloj la efiko de la feĉekstrakto estas ilustrata. En ĉi tiuj laboroj precipe estis akcentata la bonega efiko rilate stomakon.

En la lastaj jaroj la aŭtoro, polica kuracisto, havis okazon konstati ke Bromæx ĉe junaj policianoj tre bone efikis, kiam ili pro ŝanĝo de la vivmaniero kaj plialtigita sporta okupo komence montris nervozajn simptomojn. Samtempe okazis ofte manko de apetito, plej ofte pro hiperacideco stomaka sur bazo nervoza. Preskaŭ en ĉiuj kazoj post nelonga tempo la nerva sistemo trankviliĝis, la naŭzaj sentoj malaperis kaj la apetito revenis.

Resumante oni povas diri ke Bromæx pro la bonefiko sur la ĝenerala bonfarto kaj pro la sendanĝereco ĉe longa apliko povas esti nepre rekomendata, precipe ĉar ĝi klinike ege efikas.

A. KAPLAN (Wilno). — **La problemoj de perforacio de peptika ulcero.** (El *Gastrologia Polska*, II, n-ro 3, 1930.)

616.33 -002.44

Bazante sin sur unu kazo de perforacio de peptika ulcero, aperinta en hospitalo, la aŭtoro pristudas la demandojn ĝenerale kaj ankaŭ la antaŭgardajn rimedojn. Citinte vicon da statistikaj kaj diagnozaj faktoj, la aŭtoro substrekas la malfacilecon antaŭvidi minacantan perforacion eĉ ĉe personoj, konsiderantaj sin tute sanaj.

Laŭ la opinio de la aŭtoro, tio estas kazoj, ĉe kiuj ulceron akompanas stomaka kataro (moliĝo de stomakaj muroj).

Priparolante la malutilajn momentojn, emigrantajn al perforacio, la aŭtoro atentigas pri la influo de rentgenologia esplorado. Li montras, ke la pezo de kontrastilo, kutime uzata ĉe stomakesplorado, superas iofoje la pezon de lakto, aplikata ĉe dieta kuracado de ulcero. Tie troviĝas la danĝero de perforacio; la kliniko de

HOCHENEGG en Wien uzas kontrastilon modifitan, konsistantan el 40,0 da bario diluita en 1/4 kg. de manna buljono.

La kazuistika kazo de P-ro COBET el la vico de ekspertizoj ĉe socia asekurado pravas la malfacilecon, kiu aperas ĉe difino de la dependeco de perforacio de profesia traŭmo.

En konkludo la aŭtoro citas la statistikon de ĥirurgia kuracado de perforitaj ulceroj. La morteco atingas 10-20 % laŭ la literaturo, 10 % laŭ rezultoj, ricevita en la izraelita hospitalo en Wilno.

HUET kaj BLANCSTEIN. — **Hepata hipertrofia cirozo kun grava ascito. Resaniĝo per diatermio.** (El *Bulteno de la franca Societo de elektroterapio kaj radiologio*, n-ro V, 1931, p. 441.) (1).

616.36 -004 -085.846

38jara virino, tre malgrasa, astenia, ĉe kiu oni forigis sinsekvje 10, 15, 20 litrojn da ascita likvaĵo, kies hepato estis ampleksa, kiu urinadis nur 750 kom. Ĉiutage malgraŭ la uzo de diureno (adonido) kaj heptalo (hidrargo), kies subaj ekstremaĵoj estis ŝvelintaj per edemo, estis kuracata de la aŭtoro per diatermio. Seanco 20 minutojn ĉiutage. 1-1 1/2 ampero. Elektroda plataĵo 30 x 40 cm. ĉe dorso; plataĵo 24 x 30 ĉe hepata regiono. Post 10 seancoj, grava pliboniĝo de la ĝenerala stato kaj de la urinado (1 1/2-2 litroj tage). Post 20 seancoj, la talia ĉirkaŭo kiu mezuris antaŭ la kuracado 1 m. 30, nun mezuris 1 m. 20. Post unu monato de haltigo, nova serio de 20 seancoj. Urinado 2-3 litroj ĉiutage. Talia ĉirkaŭo 1 m. 05. Dua haltigo dum unu monato. Tria serio. Tuta resaniĝo sekvis. Post kelkaj monatoj la malsanulino gajnis 27 kiogram.

BRIQUET (Lille).

SAHARA. — **Signifo de la endokrinsistemo en heredfenomenoj.** (El *Vestnik Endokrinologii*, vol. III, n-ro 3, 1930.)

616.4

I. — Disvolviĝo, kiel heredado, prezentas ĥemiajn procesojn en la organismo, kiuj tutatempe koreladas kun eksternaj reagentoj.

La organismo povas esti konsiderata kiel rezistenta ekvilibro de iu moveca stato.

Morfologa konstanteco estas sekvo de ĥemia ekvilibro, en kiu la endokrina sistemo ludas ĉe mambestoj la plej gravan rolon.

II. — Fiziologi-statoj ankaŭ estas statoj de vidata ekvilibro de la diversaj sistemoj.

Ŝanĝeco estas akirado de nova ekvilibro.

Heredado de akirita ŝanĝaĵo estas heredado de nova ekvilibro-stato.

Heredado de nova ĥemia stato okazas per citoplasma heredado kaj, eble, ankaŭ per ĥromozoma heredado.

Vojo de ortogenezo, ortoselektado kaj selektado efektivigas la evoluadon.

A. PENCİK (Ĥarkov).

(1) En la sama bulteno (P. 444 kaj sekvantaj) D-roj MARCHAND, STUHL, HUET, FOUBERT referas pri aliaj cirozuloj same kuracitaj per la diatermio; sed unuj sukcese, aliaj sensukcese.

DAVID (Lille). — **Kiel kuracisto faris grizkolorajn klientojn. Terapeŭtika arĝirio.** (El *Bruxelles-Médical*, 24-7-1932.)

616.5 -003.656.6 -02: 615.755.14

Antaŭ 50 jaroj aperis kazoj de arĝirio post longa kuracado de tabeso per arĝentnitrato. Novaj sufiĉe multaj kazoj de tiu afekcio okazis antaŭ nelonge en Norda Francujo sekve de kuracado (de pulma tuberkulozo) *eltrovita* de kuracisto, kaj momente ŝatita de klientaro dank'al influo de gazetoj; la *resanigo* (?) de la tuberkulozuloj estis akirata per diatermio kaj per senfina perbuŝa donado de kolargolo, t. e. koloida arĝento !

P-ro David referas pri du tiaj kazoj de arĝirio; unu el la malsanuloj englutigis dum 4 jaroj 10.600 pilolojn entenantajn ĉiu 0,05 ctgr. da kolargolo (sume 530 gr.) La griza koloriĝo aperis post 12-18 monatoj. Ŝajnas ke la du malsanuloj estas kolorigitaj per grafito. Ilia vizaĝo estas nigregriza, ankaŭ la lipoj, ankaŭ la buŝa mukmembrano; ĉe gingivoj neniu speciala borderaĵeto (F. *liséré*). La koloriĝo mildiĝas ĉe kolo; la torako estas apenaŭ blua; mankas koloriĝo ĉe subaj ekstremaĵoj, sed ekzistas ĉe antaŭbrakoj, kaj plie ĉe manoj kaj ungoj. Bedaŭrinde la pigmentado restadis kaj restados malgraŭ ĉeso de kuracado, kaj oni ne miras ke la individuoj tiel koloriĝintaj ne estu tute kontentaj, tiom pli ke ilia tuberkulozo kompreneble ne pliboniĝis.

BRIQUET (Lille).

P. DELMAS-MARSALET. — **Ostaj malsanoj kaj perturboj de la kalcia metabolismo; pri resaniĝo de du kazoj de malsano de Paget kaj de malsano de Recklinghausen.** (El *Presse Médicale*, 1932, n-ro 15.)

616.71 -002.26 -085.739.127

La aŭtoro priskribas du kazojn: unu de malsano de Paget, la alia de malsano de Recklinghausen. La unua estas tipa. Pri la dua li insistas sur grava fakto, kiu en tiu malsanulino estis rimarkinda: dolora irado. Konsiderante la senkalciigan procedon en ĉiu el tiuj malsanoj, li insistas pri la fakto, ke estas necese pripensi sammaniere, kiel se temus pri avitaminozo D kune kun kalcia nesufiĉeco kaj eĉ en la kazo de Recklinghausen, kiu povas esti plibonigata per paratiroidektomio, li proponas, ke antaŭ la operacio, oni sisteme elprovu la sekvantan standardan kuracadon, dum ses monatoj minimume:

Ĉiutage: 1° Vitamino D en olea solvaĵo, je taga dozo de 7.500 unuoj (kontraŭraliitaj-rato) prenata en malvarma lakto en du fojoj; 2° Tri kalkuleroj da pura kalcia glukonato « Calcium-Sandoz » (grajneto pulvoro), t. e. ĉirkaŭe 12 gr. Trifoje ĉiusemajne unu enŝpraco en muskolen de 10% solvaĵo de kalcia glukonato. Ĉiun trian monaton, oni devos fari radiografajon. Tiu kuracado devas (laŭ D-ro Delmas-Marsalet) esti elprovata en osteomalacio kaj en leontiazo osta.

En tiu kuracado, kio en la du kazoj supre priskribitaj bonege efikas, ne estas fosfora medikamento; konsekvence, fosfora nesufiĉeco tute ne povas esti konsiderata kiel kaŭzo de tiuj malsanoj.

R. MAES-DUBOIS (Bruxelles).

DUCOURTIAUX kaj BARBARA. — **Kontraŭ la planda veruko.**
(El *Presse Médicale*, 27-1-1932.)

617.586.1 -006.392 -08

La veruko kuŝas en malmolaĵo; unue oni devas moligi tiun ĉi per ĉiutaga piedbano sufiĉe longa, sufiĉe varma, kaj per ĉiutaga apliko de pomado tre riĉenhava je salicilata acido (10 gr. por 30 gr. da vazelino). Post la piedbano, apliku sur la plando plastropacon (dialilono aŭ leŭkopastro) kies centro estas fortranĉita (la truo estu samdimensia kiel la malmolaĵo); kovru tiun malmolaĵon per dika tavolo de la supredirita unĝento; poste kovru per peco de plastro 1 x truita, samdimensia kiel la unua plastropaco. Post 5 aŭ 6 tagoj iĝas facile per bisturio aŭ razilo forigi la malmolaĵon, kaj sub tiu ĉi, oni trovas la plandan verukon kiu saĝnas esti amaseto de grizaj papiloj elmergiĝantaj el kavaĵeto. Forigu la verukon per kavskrapileto kaj poste kaŭterizu (post kokainizo sebezono) per galvanokaŭterizilo, termokaŭterizilo aŭ pli bone per diatermia pintaĵo. Malgrava asepsa bandaĝo sufiĉas, kaj kutime ripozo ne estas necesa.

BRIQUET (Lille).

CHARPY. — **Kuracado de ekzemo per loka malvarmigo kaj injekt-oj de ceziuma eozinato.** (El *La Clinique*, decembro 1931.)

616.521 -08

La aŭtoro ĉe 2000 kazoj de ekzemo (akuta aŭ kronika) akiris pli ol 80% resaniĝojn per

1) Kaŭterizado ĉu per karbonata neĝo pura, ĉu per miksaĵo de karbonata neĝo kaj acetono, ĉu pli bone per fluidigita aero;

2) Uzo de jena pomado :

Pr./	Resorcino	1.00 gr.
	Salicilata acido	0.50 gr.
	Gudroleo de junipero	5.00 gr.
	Ihtiole	5.00 gr.
	Zinka oksido	6.00 gr.
	Vazelino	40.00 gr.

3) Envejna ĉiutaga injekto de 5 kem. da solvaĵo po 6% de ceziuma eozinato (Firmao Clin).

La kaŭterizo devas esti sufiĉe forta por ke okazu grava haŭta reago kaj apero de fliktenoj. Plej ofte ne estas necese kaŭterizi la tutajn lezojn, kaj ekzemple se la du manoj estas lezataj sufiĉas kaŭterizi la plej malsanan.

Sufiĉe ofte, ekzemo reaperas, sed malpli grave, kaj la supredirita kuracado denove ĝin forigas, kutime definitive.

La kaŭterizoj estas farotaj unufoje semajne, dum kelkaj semajnoj.

Severa dieto ne gravas; sufiĉas malpermesi alkoholon, spicojn, malfacile digesteblajn nutraĵojn. Pripensu pri la mallakso.

La kialon de la resaniĝoj oni ne konas; eble aperas per la kaŭterizado humoraj produktaĵoj kaŭzantaj la malsentemigon (F. *désensibilisation*).

BRIQUET (Lille).

COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE

Antaŭe Firmoj

Gaiffe-Callot & Pilon kaj Ropiquet, Hazart & Roycourt

Anonima Societo kun kapitalo de 21.000.000 fr. frankoj.

Boulevard de Vaugirard, 34 PARIS (15°)

FILIOJ { **BORDEAUX, 67, Cours de Verdun**
LILLE, 8, Rue Caumartin
LYON, 25, Quai Tilsitt

ĈIO KIO KONCERNAS LA MEDICINAN ELEKTRON KAJ LA X-RADIOJN

Raportetoj kaj prezoprojektoj senpage laŭ demando

Registre du Commerce Seine n° 70.761.

La Profita

Kuracilo de malfortigoj ĉe suĉinfanoj

(dispepsio, distrofo, atrofo, malkomponiĝo, frunaskoj, k.t.p.)

LITERATURO : *Finkelstein, Langstein, L. F. Meyer, E. Müller, Schlossmann, Feer, k.m.a.*

Nutriga rimedo dum resanigo

ĉiuspeca : post operacioj, sangoperdo, febro, ĉe nasko, mamnutro, denutrado, stomak- kaj intestusuferoj, anemio, diabeto, k. t. p.

LITERATURO : *Hofmann, Praussnitz, Caspary, Bickel, Rubner k. m. a.*



PLASMON - Laktalbumino

Analizo : 76% albumino, 2.5% kalko, 3% fosfata acido.

Biologie plenefika albumino

Literaturo kaj specimenoj laŭdemande.

PLASMON-GESELLSCHAFT m.b.H., Neubrandenburg Mecklb. Germanujo.

Seksa Nervastenio

OKASA

LAŬ SEKRETA KONSILANTO D-RO MED. LAHUSEN

Okasa Silber

por viroj

Okasa Gold

por virinoj

kiel afrodiziiga rimedo elprovita de jaroj

Okamen

kontraŭ klimakteriaj malordoj

KONSISTO

OKASA enhavas pluriglandajn ekstraktojn kun plena hormonenhavo kaj organekstraktojn. Ankaŭ bone studata eksterlande kiel afrodiziigilo.

La hipofiza kaj generglanda hormonoj estas standardizitaj.

OKAMEN enhavas hormonan ovari- kaj lien-substancon, vegetajn substancojn kun reguliga ago sur koron, renojn kaj nervojn. Sendoloriga rimedo.

Senkostajn specimenojn postulu de

HORMO-PHARMA G.m.b.H. BERLIN S 14 (Germanujo)

Oerelin

Ol. lavand., Ol. macid., Ol. pin. silv., Ol. tereb.,
Comph., Ammon., Thymal. Alc.

kl.O.P. 110

Ekstera frotrrimedo kontraŭ
neŭralgiaj kaj reŭmatikaj di-
fektaj, ishia neŭralgio, sport-
difektoj. Permesita de mult-
nombraj malsanulkasoj.

Fineural

Promisoval urea 0.2, Pyz. dim. aminophenyl
tim 0.2, Cod. phosph. 0.005, Extract bellad. 0.01

Por dolorforigo kaj trank-
viligo en neŭralgioj, grupo
kaj dismenoreo.

10Tabl. 055
20 Tabletten 0.9

Oerelin estas enskribita en la formularo de la
germana kuracil-komisiono, V. eld. p. 150.


Dr. Oehren & Co. Berlin SW 61

LESCAUT (Lille). — **Kazo de denaska senokuleco (anoftalmio).**
(El *Journal des Sciences Médicales de Lille*, 5-6-1932.)

617.7 -007.21 -053.1

La aŭtoro referas pri kazo de denaska senokuleco. Tiuj kazoj estas tre maloftaj (50 kazoj en la med. literaturo proksimume).

17monata infanetino. Dekstre, la palpebroj estas malgrandaj (8 milimetra fendo), internen kurbigintaj; maldekstre, la suba palpebro estas antaŭen iom puŝata de blua amaso nuksetampleksa, kiu ŝajnas esti aŭ koloboma kisto, aŭ angiomo (verŝajne ektomiota ĉar ĝi kreskadas). Tiu infaneto estas la unua kaj la sola de la geedzoj (edzo 28jara, li mem sola infano; patrino 26jara, kiu havis 10 gefratojn el kiuj nur du mortis pupej). Nenia etiologio trovita: B-W nula; neniuj sampatreco, k.t.p.



La patogenio de la denaska senokuleco povas esti, aŭ kreskadhaltigo de la primitiva okula veziketo ĉe embrio, aŭ inflama forigo de la okula globo iom da tempo post ĝia apero (la plej ofte ĉe sifilidoj).

BRIQUET (Lille).

.....

DIVERSAĴOJ

ELMONTRILA VARBASOCIO DE SVISAJ APOTEKISTOJ S. W. S. A.

Vi ĉiuj scias, ke la moderna apoteko nuntempe en nenia lando povas vivi sen varbado. Mi nur konstatas la fakton kaj ne volas diskuti, ĉu estas bone tiel aŭ malbone. Inter la diversaj varbiloj, certe la elmontrilo de la apoteko mem estas la plej taŭga kaj samtempe la plej efika kaj la plej malmultekosta varbilo. Je rekono de



Fig. 1. — Antaŭgardi estas pli bone ol kuraci. Speciala fono el fibroŝtofo, uzebla por diversaj medikamentoj, en nia bildo por hepata fiŝoleo.

tiuj faktoj, 15 Svisaj apotekistoj fondis antaŭ preskaŭ du jaroj la Elmontrilan Varbasocion de Svisaj Apotekistoj (*Schaufenster Werbegemeinschaft Schweizerischer Apotheker*). La celo de tiu ĉi asocio estas, doni al siaj membroj la eblecon, varbi per bonaj (precipe de artistoj faritaj) elmontriloj por la diversaj varoj de la apoteko mem. Por la de fabrikoj faritaj produktoj, la industrio ja donas sufiĉe da materialo por la elmontriloj.


Permesu al mi kelkajn vortojn pri la *organizo*. Per kolekto de la mezuroj de la diversaj elmontriloj de niaj je la komenco 15 membroj mi elverkis normalan mezmezuron por niaj fonoj kaj trovis altecon de unu metro kaj larĝecon de 2,6 metroj. Preskaŭ ĉiam la fundoj estas pentritaj de artistoj sur solida tuko kaj poste ili estas lueblaj je unu kvinono de la prezo. La praktiko montris, ke tia maniere oni ĵus ne havas deficiton. La fundoj estas lueblaj nur por tuta monato kaj ĉiam je la fino oni devas, aŭ resendi ilin, aŭ sendi

Patentex

D.R.P.

Vagina antisepsilo, profilaksa

De pli ol 25 jaroj elprovita en la manoj
de la kuracistoj. — Fidinda en la agado,
simpla en la uzo, senlime tolerebla.



Patentex-Fabrik. Frankfurt A. M. (GERMANUJO)

ARCTUVAN

laŭ D-ro E. WOSSIDLO

(Konsisto: Ekstr. uv. ursl. kaj lign. sant., Fen. sali., heksamet. tetram.)

Nova kuracilo kontraŭ ĉiuj akutaj kaj kronik. pielitoj kaj veziko-pielitoj,
ĉiuj formoj de vezikaj malsanoj, de malsanoj de la vezikkolo, gonoreo kaj
ties komplikadoj.



Literaturo kaj specimenoj de D-ro Otto Krause, Magdeburg, Germanujo.


SPETON

Profilaksa Vagina Desinfektilo

en

sengrasaj,
solveblaj premaĵoj

INDIKOJ :



Internacia protektita
fabrik-marko

Kontraŭ blanka fluo, metrito kaj erozioj.

Specimenoj kaj literaturo senpage al kuracistoj.

TEMMLER-WERKE

Berlin-Johannisthal

(GERMANUJO)

al alia membro. La luprezoj devas ĉiam esti pagataj je la mezo de la lunonato sen ia avizo. Ni pro tio havas specialan poŝtĉekkonton. Se oni devas sendi al membro, kiu ne pagis je la fino de la monato



Fig. 2. — Ĉion por flegado de infanoj. Tre viva bildo de Magda Werder kaj tre efika kun elmontro de tiuspecaj artikoloj.

kalkulon, tiu ĉi estas plialtigita po 50 centimoj por « eviteblaj kostoj ». De ĉiuj novaj elmontriloj aŭ fonoj mi faras fotobildojn kaj sendas ilin al ĉiu membro de la asocio, tiamaniere ĉiuj bone scias, kion oni povas havi kaj jam antaŭe povas bone prepari la



Fig. 3. — Vi forgesis vian vojaĝapoteĉon. Bonhumora bildo por dumsomera almontraĵo de diversaj vojaĝapoteĉoj kaj bandaĝartikoloj.
Verkistino: Klara Fehrlin.

elmontraĵojn. De tempo al tempo mi dissendas cirkulerojn kun la necesaj komunikaĵoj. Ĉiu aktiva membro pagas, krom la luprezoj, jaran kotizon de 30 frankoj, estas ankaŭ kelkaj pasivaj, kiuj nur ricevas la bildojn kaj komunikaĵojn sed ne povas lui fonojn. Ili pagas

15 frankojn (unu el ili estas en Pollando). Malfacilaĵo estis je la komenco la du ĉefaj lingvoj de nia lando, sed nun ni ne plu faras ĉiam du diversajn fonojn, unu kun franca kaj unu kun germana lingvo, sed se eble ĉiam sur la sama fono estas ambaŭ lingvoj. Menciinda estas ankaŭ la fakto, ke laŭ regularo en ĉiu urbo aŭ urbeto nur unu apotekisto povas esti membro de S.W.S.A.; nur en



Fig. 4. — Venigu la mineralajn akvojn ĉe vin. Trinkkuracado hejme ŝparas multekostan vojaĝon al banloko. Ankaŭ bonhumora fono por elmontri la diversajn mineralajn akvojn. Verkisto: Glinz.

tre grandaj urboj estas eble pluraj, sed nur, se je aliĝdeziro de nova ĉiuj aliaj konsentas. Ĉiu membro rajtas fari proponojn por novaj fonoj kaj dum tiu ĉi jaro ni eldonis 12 novajn. S.W.S.A. nuntempe havas 21 aktivajn kaj 4 pasivajn membrojn inter la aktivaj estas 14 germanlingvanoj kaj 7 francalingvanoj.

La bildoj estas nur kvar specimenoj el pli ol 50 diversaj fonoj kaj elmontrilartikoloj, pri kiuj S.W.S.A.-membroj nun disponas. La kliŝoj volonte disponigis al ni « Verunda » en Ründeroth, Germanujo, speciala gazeto por la varbado de la apoteko, (germanlingve eldonita) kaj mi ĉi tie kore dankas al la eldonisto, S-ro K. Gissinger.

D-ro R. MAEDER-LOEFFLER (St. Gallen).

XXVa UNIVERSALA ESPERANTO-KONGRESO

Kolegoj, intencantaj partopreni la Universalan Kongreson de Esperanto en Köln, bonvolu sin anonci al ni, por interkonsente fiksi programon de niaj kunvenoj..

MUTOSAN

Klorofilin-Saponin-Silicio-preparaĵo elprovita de pli ol 10 jaroj
en la kontraŭbatalo de

TUBERKULOZO, BRONĤITO, TUSO

de grava signifo kiel profilaksilo post gripo, pulmaj kaj pleŭraj
inflamaĵoj por malhelpi kaj resanigi komencantan tuberkulozon.

MUTOSAN-SIROPO

1 botelo = kvanto por unu semajno

MUTOSAN-TABLETTEN

1 tubo = kvanto por unu semajno



D-ro E. UHLHORN K^{io}, Ĥemia Fabriko

Wiesbaden-Biebrich (Germanujo).

Tonika

NERVONUTRA KVIETIGA DORMIGA

NERVOPHYLL

Konsisto: Klorofilin, bromsalo,
fenagono, anidoprino, dietilbarbi-
turata acido en molekuloj,
kunigilo.

Solvaĵo en boteloj po 200 gr.
Premaĵoj en tuboj po 15 pecoj.
Literaturo je dispono.

MALALTAJ DOZOJ — GRANDEGA EFIKSKALO!

Certa Ŝpariga

estas « SAGROTAN », la nuntempa desinfektilo kun agrablaodoro kaj plej forta bakteri-mortiga kapablo; tute ne domaga, speciale ŝpariga je uzo ĉar en kazoj kiel akuŝoj, ĝi estas uzata en nur 1/2 %a solvaĵo; speciale dediĉata al desinfektado de manoj kaj instrumentoj, ankaŭ al akuŝarto kaj ginekologio.

En Germanujo per ministeriaj decidoj rekomendita por la akuŝarto.

“SAGROTAN”

(registrita marko).

Specimenoj kaj literaturo senpage de

SCHÜLKE & MAYR Aktien-Gesellschaft, Hamburg 39 (Germanujo)

D-ro Bernard KAPELNER

ordinacias por internaj malsanoj

MERANO

Andrea Hofer, I

de la 1a de Oktobro ĝis la 1a de Majo.

MARIENBAD

Weisser Schwan

de la 1a de Majo ĝis la 1a de Oktobro.

**NIAJ ANONCANTOJ Korespondas
ankaŭ ESPERANTLINGVE**

PERUGEN (Dro. EVERS)

(Artefarita Peru-Balzamo)

Longe provita vundkuracilo, specifa kontraŭ

PARAZITAJ MALSANOJ

Originalaj boteloj entenantaj 30, 50, 100, 250 gramojn.

**HEMIA FABRIKO REISHOLZ, G. M. B. H., Duesseldorf-Reisholz
(Rejnlando)**

DUA INTERNACIA KONGRESO DE LA LUMO

Tiu kongreso okazis en Kopenhago, de la 15a ĝis la 18a de Aŭgusto 1932. Pri ĝi L. DEKEYZER publikigis en Bruxelles-Médical () detalan raporton, kiun li finiĝas per personaj rimarkoj. Tiun lastan parton ni tradukis kaj presigas ĉi sube.*

K.

Tiu kongreso estis admirinde organizata, kaj estis speciale grava pro la valoro de la diskutitaj raportoj kaj pro la atingitaj rezultoj.

Oni fine interkonsentis por starigi mezur-unuon de la ultra-violaj radioj. Ĝi estis malfacilaĵo preskaŭ nevenkebla, ĉar fizikistoj kaj aktinologistoj vidis la problemon laŭ malsamaj vidpunktoj. Sendube la aparat-fabrikistoj fine ne plu valorigos siajn aparatojn, insistante pri la nombro de kandeloj, ĉar tiu ĉi havas nenion komunan kun la aktina povo.

Dua punkto ŝajnas esti akceptita. Temas pri la graveco de la pigmentado. Oni nun preskaŭ unuanime akceptas la ideon, ke la pigmentado ne estas faktoro de resaniĝo kaj ne estas terapeŭtika atesto. Kontraŭe, ĉar la resaniĝo estas plimalrapidigata aŭ malhelpata de tro rapida pigmentado. Same, ĝi estas sendependa de alkutimiĝo.

Fin, ĉiuj specialistoj, kiuj uzas lumon, protestis kontraŭ la nuna laŭmoda uzo de lumbanoj, aplikitaj senmetode kaj sengrade, *riskante difekti la sanon de junuloj kaj maljunuloj laŭŝajne bonsanaj.* (Bordier).

Tio bedaŭrinde estas malbona kutimo, subtenata de la gazetaro, eĉ de tiu, kiun mi volonte nomos anekdota, kiu, kvankam amuza, nenion scias pri tiuj malsimplaj problemoj. Bedaŭrinde, nekompetentaj kuracistoj sekvas la movadon, kaj ĝin kuraĝigas per ne pripensitaj asertoj. Tiuj, kiuj povas montri forte brunigitan haŭton, kredas, ke ĝi estas atesto de bona sano, kvankam temas nur pri fenomeno ŝirmanta kontraŭ la lumradioj, kaj ne pri signo de bona ĝenerala sano. Mi jam altiris la atenton pri tiuj faktoj en prelego, kaj mi ĉi tie denove preparolas la temon, apogita de la aŭtoritato de la Luma Kongreso.

La akcidentoj ne estas maloftaj, kaj ili ne estas pli oftaj dank'al la banvestaĵoj, kiuj ŝirmas grandan parton de la haŭto. Sur komencantaj nefritoj kaj tuberkulozojn, kiujn nenio malkaŝis, tiuj lumbanoj povas havi gravan influon.

L. DEKEYZER (Bruxelles).

(*) 12a Jaro. n-roj 46 kaj 47.

.....

Deutsche Medizinische Wochenschrift

Begründet von P. BÖRNER — Fortgeführt von J. SCHWALBE

Organ der Berliner Medizinischen Gesellschaft,
des Vereins für Innere Medizin Berlin und anderer Gesellschaften

Schriftleitung :

Prof. Dr. R. VON DEN VELDEN — Privatdozent Dr. P. WOLFF

Mit dem Beiblatt « PRAEMEDICUS »

Offizielle Mitteilungen des Verbandes Deutscher Medizinerschaften

59. Jahrgang / 1933

Bezugspreis vierteljährlich M. 6.20 zuzüglich Postgebühren

Für Studierende

und Ärzte, die noch nicht zur Kassenpraxis zugelassen sind oder
sich in nicht vollbezahlter Stellung befinden

vierteljährlich M. 3.10 zuzüglich Postgebühren

GEORG THIEME — VERLAG — LEIPZIG

Fortschritte der Therapie

Organ des Verbandes der Krankenhausärzte Deutschlands E. V.

Herausgegeben von

Prof. H. v. HABERER, Köln — Prof. R. TH. v. JASCHKE, Giessen

Prof. R. VON DEN VELDEN, Berlin

Schriftleitung: Privatdozent Dr. P. WOLFF, Berlin

9. Jahrgang 1933 — Jährlich 12 Hefte

Bezugspreis vierteljährlich M. 3.— zuzüglich Postgebühren

Für Abonnenten der « Deutschen Medizinischen Wochenschrift »
und Studierende

vierteljährlich M. 2.50 zuzüglich Postgebühren

FISCHERS MEDIZINISCHE BUCHHANDLUNG — LEIPZIG

INTERNACIA SCIENCA LINGVO

Tiujn, kiujn interesas la temo *latino, internacia scienca lingvo* ni atentigas pri artikolo aperinta en l'*Esperanto* de Milano « *Il latino e la Scienza* » (itallingve).

Pri preskaŭ sama temo aperis en *Le Concours médical* (9-11-1932) artikolo de G. Lavalée, kiu entenas tute ekzaktajn pensojn pri la malemo de Francoj kaj plie ankoraŭ de Angloj, al la studo de fremdaj lingvoj. La aŭtoro ne ŝajnas rekomendi la latinan lingvon, sed opinias ke ĉiu mense kulturita homo devus funde koni tri lingvojn, anglan, francan, hispanan. Neniu vorto pri Esperanto, kiu tamen estas multe pli praktika, ĉiu tion konfesos!

.....

NOVAĴETOJ

FRANCUJO. — La 3a kongreso pri ripariga, plastika kaj estetika ĥirurgio okazis en Paris, la 7an kaj la 8an de oktobro 1932. Ĝin prezidis D-ro DARTIGUES (Paris). Interesaj prelegoj kaj prezentadoj estis farataj de multaj diverslandaj kolegoj.

GERMANUJO. — Dank'al klopodoj de D-ro BLUTH la banurbo Neuenahr havos straton « *Zamenhof* ».

.....

ESPERANTISTA KRONIKO

FRANCUJO — En *Revue Moderne de Médecine et de Chirurgie* (1), 1932, n-ro 4, ŝatinda artikolo de D-ro REYNAULT, ĉefredaktoro, pri la *neŭŝgeco* de latina kiel internacia medicina lingvo; la aŭtoro konkludas favore al Esperanto.

GERMANUJO. — En sia numero de la 27-11-32, *Heroldo de Esperanto* publikigis la unuan liston de aliĝintoj al la XXVa Universala Kongreso de Esperanto okazonta en Köln de la 29-VII ĝis la 5-VIII-1933. La listo enhavis jam 150 nomojn el 18-landoj.

POLUJO. — Nia samideano kaj TEKA-ano P-ro D-ro BUJWID el Krakovo estis de la Prezidanto de la Pola Respubliko honorige alte distingita per « *Komandora Kruco* de ordeno de la Renaskiĝo de Polujo ».

Li estas ankoraŭ nomita la unua honora membro de la Ĉeĥoslovaka mikrobiologia societo: « *Č II společnost mikrobiologická* ».

— La 18an de aprilo 1932, P-ro O. BUJWID prezidis festvesperon aranĝitan de Societo Esperanto en Krakow.

— En Lwow, D-ro FELS faris tre interesan paroladon pri « *Goethe kaj liaj verkoj en Esperanto* ».

USONO. — Nia fervora kolego D-ro VAN BECELAERE (San Diego, Kalifornio) propagandas per artikoloj en diversaj medicinaj gazetoj: taŭga artikolo pri Esperanto en *Medical Journal and Record* septembro 1932, p. 213; referatoj pri artikoloj de *Internacia Medicina Revuo* kun indiko de deveno: *Diagnozo inter malario kaj sifilo* de POLUBOV en *Western Medical Times* januaro 1931; *Medicina sekreto post la morto de la kuracisto* en *Western Medical Times* februaro 1931; *Diagnozo de grave-deco postlimtempa kaj limtempa* de ROSENBLATT en *Medical Journal and Record* novembro 1931. *Imitinda ekzemplo!*

(1) 20, rue Geoffroy l'Asnier, Paris (IV^e).

.....

BIBLIOGRAFIO

MEDICINO

Gazetoj.

ESPERANTLINGVE

— En Bulteno n-ro 3 de la *Jurmedicina Instituto de la Medicina Fakultato de Nagasaki* estas esperantlingvaj resumoj de la originalaj verkaĵoj, kies aŭtoroj kaj titoloj estas:


Tyūzi Tačami: Influo de Hormono de Homa Urino kontraŭ Vostfenomeno de Musoj Entoksigitaj per Morfino. — Titō Yamamoto: Certigo de Neutraleco Sanggrupa de Placento kaj Umbilika ŝnuro per la Sero de Angilo. Esploroj Eksperimentaj pri kelkaj Funkcioj kaj precipe Aktiviga Kapableco de Adrenalino. Klimata ŝanceliĝo de Aglutinintitro de Homa Sero kaj Aglutinebleco de Homaj Eritrocitoj. Esploroj Eksperimentaj pri Kelkaj Funkcioj kaj precipe Aktiviga Kapableco de Adrenalino. — Siduo Kurista: Influoj de Lecitino sur Biologiajn Reakciojn, nome influo sur Aglutinadon, Precipitadon, Hemolizadon, Produktadon de Antikorpoj, Toksaj Medikamentojn, Kadavran Rigedecon. — Makoto Nakamura: Sangsukero kaj Substanco Reakciebla al Jodacido de Sero antaŭ kaj post Injekto de Peptono ĉe diversaj Kondiĉoj. (Dua Raporto: Influo de Injekto de Insulino kaj Glikozo). Sangsukero kaj Substanco Reakciebla al Jodacido de Sero antaŭ kaj post Injekto de Peptono ĉe diversaj kondiĉoj. Tra Raporto: Influo de Adrenalino kaj Tiradino). Urinsukero kaj Sangsukero post Injekto de Sukero kun aŭ sen Peptono. Sangsukero kaj Sangsukero Kombinata post Injekto de Glikozo sen aŭ kun Peptono.

NACILINGVE.

— *Kronika Dentystyczna* (Warszawa) publikigas, en n-ro 4a de 1932, longan artikolon de D-ro St. ESSIGMAN kun aŭtoreferato en esperanto.

La *Estraro de T. E. K. A.* kaj la *Redakcio de I. M. R.* prezentas al siaj altŝatataj protektantoj, abonantoj, kunlaborantoj kaj anoncantoj siajn plej korajn bondezirojn por 1933. Ili antaŭe dankas tiujn el ili, kiuj elektos, kiel plej efikan formon de deziresprimo, tujan alsendon de sia abonkotizo.

VI KRIMAS KONTRAŬ VI MEM !



**VI NE SENDIS ANKORAŬ VIAN ALIĜILON AL
ASOCIO DE ESPERANTISTAJ LIBRO-AMIKOJ!**

Sendu antaŭ la 1a de februaro al Literatura Mondo por A.E.L.A.,
Hungariujo, Budapest, IX, Mester ucca 53

DIABETO-PREPARATO

“BELLINGUOL”

Leĝe Ŝirmata

La nova perbuŝa preparado kontraŭ melita diabeto

Aplikadmaniero: 3foje dumtage antaŭ la manĝado preni 2-5 tablojdojn.

Efiko: Malplialtigo de urina kaj sanga sukero, rimarkinda plibonigo de l'korpa bonstato, kaj de laborkapableco, plimultigo de l'pezo. Vere taŭga kaj porsana, neniaj nedezirataj kromaj efikoj, eĉ ĉe grandaj dozoj. Superdozadon oni ne timu.

Literaturo: *Fortschr. der Medizin* (La progresoj de l'medicino) 1927, n° 30.
Originale pakita po 30 tablojdoj 1,2 marko, 4,80.

Fabrikanto:

Arzneimittelfabrik (fabriko por medikamentoj)

JOHANN CH. BELLAS, Berlin-Hohenschönhausen (Germanujo)

Kontraŭ :

Tuso

Kokluŝo

Katara bronĥito

Grip-maloportunajoj

Ĉiam :

SIBROFORM

la prominenta Kodein • bromoform • preparaĵo

Miriga kaj senmanka efiko

Agrabla gusto

Malalta prezo

(Patente protektita de 1909)

Preparanto : **" DREB "** ĥemi — farmaci — laboratorio

D-ro E. Buchwaldt kaj Siebje

Berlin - Charlottenburg, 1

(GERMANUJO)

Impr. Médicale et Scient., rue Botanique, 34, Bruxelles.

